

Informācija par *AstraZeneca* vakcinācijas kontraindikācijām

Informācija sagatavota, pamatojoties uz SPKC vakcīnas COVID-19 Vakcīnas *AstraZeneca* zāļu apraksta un Veselības ministrijas, Imunizācijas valsts padomes, Zāļu valsts aģentūras, Nacionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātas Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatas (versija 03.02.2021.).

- Absolūtās kontraindikācijas (**vakcinācija nav ieteicama**);
 - Anafilakse (smaga alerģiskā reakcija) pēc iepriekšējās konkrētās vakcīnas devas saņemšanas;
 - Anafilakse (smaga alerģiskā reakcija) pret kādu no vakcīnas komponentēm (L-Histidīns, L-Histidīna hidrohlorīda monohidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Polisorbāts 80 (E 433), Etanols, Saharoze, Nātrijs hlorīds, Dinātrijs edetāta dihidrāts);
 - Smaga akūta slimība ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru (>38 °C) vai akūta infekcija (jāatliek vakcinācija).

- Relatīvas kontraindikācijas (**ieteicams par vakcināciju konsultēties ar savu ģimenes ārstu**);
 - Pazemināta asins recēšana un asinsreces traucējumi;
 - Trauksmes saistītas reakcijas;
 - Grūtniecība;
 - Barošana ar krūti;
 - Novājināta imunitāte vai imūno sistēmu novājinošo zāļu lietošana (piem., kortikosteroīdus lielā devā, imūnsupresantus vai zāles vēža ārstēšanai).

Efektīvai vakcinācijai ir obligāti nepieciešams saņemt divas vakcīnas devas no viena vakcīnas ražotāja.