

Pirms vakcinācijas noteikti iesakām Jums konsultēties ar savu ģimenes ārstu.

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Zāļu valsts aģentūras Latvijā reģistrēto vakcīnu (Covid-19 vakcīnai “Comirnaty”, “Covid-19 Vaccine Moderna”, “Covid-19 Vaccine AstraZeneca”) zāļu apraksta un Veselības ministrijas, Imunizācijas valsts padomes, Zāļu valsts aģentūras, Nacionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātas Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatas (versija 23.02.2021.).

- Absolūtās kontraindikācijas (**visu veidu vakcinācija nav ieteicama**);
 - Anafilakse (smaga alerģiskā reakcija) pēc iepriekšējās konkrētās vakcīnas devas saņemšanas;
 - Anafilakse (smaga alerģiskā reakcija) pret kādu no vakcīnas komponentēm*;
 - Smaga akūta slimība ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru (>38 °C) vai akūta infekcija (jāatliek vakcinācija līdz veselības stāvokļa stabilizācijai un jākonsultējas ar ģimenes ārstu).
- Relatīvas kontraindikācijas (**ieteicams par vakcināciju konsultēties ar savu ģimenes ārstu**);
 - Pazemināta asins recēšana un asinsreces traucējumi;
 - Trauksmes saistītas reakcijas;
 - Grūtniecība;
 - Barošana ar krūti;
 - Novājināta imunitāte vai imūno sistēmu novājinošo zāļu lietošana (piem. kortikosteroidus lielā devā, imūnsupresantus vai zāles vēža ārstēšanai).

Efektīvai vakcinācijai ir obligāti nepieciešams saņemt divas vakcīnas devas no viena vakcīnas ražotāja.

**L-Histidīns, L-Histidīna hidrohlorīda monohidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Polisorbāts 80 (E 433), Etanols, Saharoze, Nātrijs hlorīds, Dinātrijs acetāta dihidrāts, polietilēnglikols (PEG) vai citu pegilētu molekulu saturošs produkts.*